

کووید ۱۹

# ابزار غربالگری

والدین و پرستار کودکان باید هر روز، قبل از فرستادن فرزندشان به مدرسه، موارد زیر را با کودک مرور کنند.


آیا کودک شما دچار هر یک از موارد زیر است:

تب ۳۷.۸ درجه سانتیگراد یا بالاتر


سرفه جدید یا بدتر شدن سرفه قدیمی

تنگی نفس


گلودرد، مشکل در بلع




بلی  
 خیر



بلی  
 خیر




بلی  
 خیر




بلی  
 خیر

آبریزش بینی



بلی  
 خیر

از دست دادن چشایی یا بویایی



بلی  
 خیر

ناخوشی عمومی



بلی  
 خیر

حالت تهوع، استفراغ، اسهال



بلی  
 خیر

به جز موارد مربوط به آلرژی فصلی یا وضعیت شناخته شده دیگر

مثل لرز، خستگی، سرخی چشم، بی اشتها



آیا کودک در ۱۴ روز اخیر با شخصی که ابتلای وی به کووید ۱۹ تایید شده، در تماس نزدیک بوده است؟

بلی  
 خیر



آیا شما یا کودکتان در ۱۴ روز گذشته از سفر خارج از کانادا برگشته اید؟

بلی  
 خیر

اگر پاسخ شما به هر یک از این پرسش ها بلی است، در خانه بمانید و فوراً خود را قرنطینه کنید. با مرکز خدمات بهداشتی درمانی خود تماس بگیرید یا به یک مرکز معاینه پزشکی مراجعه کنید تا مشخص شود به آزمایش کووید ۱۹ نیاز دارید یا خیر.

